

ACRAMITE® 480 SC

Etkili Madde: 480 g/l Bifenazate
Formülasyon Şekli: Süspansiyon Konsantre (SC)
Grubu: 20D AKARİSİT (Kırmızıörümcek İlacı)



Ambalaj:
300ml

A K A R İ S İ T

**KIRMIZIÖRÜMCEKLERİN HER DÖNEMİNDE
HIZLI VE ETKİLİ YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ**

Daha fazlası için

www.upl-ltd.com/tr



ACRAMITE® 480 SC



KIRMIZIÖRÜMCEKLERİN HER DÖNEMİNDE HIZLI VE ETKİLİ YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

KULLANMA ŞEKLİ

Elma - Avrupa kırmızıörümceği

Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Portakal - Turunçgil kırmızıörümceği

On yaprakta yapılacak sayımlarda 9 ve üzeri canlı birey görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Uygulamalar çiçeklenmeden önce yapılmalı bu dönem geçirilmiş ise meyve bağladıktan bir hafta sonra yapılmalıdır.

Pamuk - Kırmızıörümcekler

Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında ya da içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlara BKÜ uygulaması yapılmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesi'nde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 10 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Popülasyonun yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinde en az 50 yaprak incelenir. Yaprak başına 15 ve üzerinde kırmızı örümcek tespit edilmesi halinde uygulamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.






Bağ - İki noktalı kırmızıörümcek

Yayılgı gösterdiği bağ alanları gözlem altında tutulmalı, bir yaprakta 5-8 adet zararlı bulunduğunda kimyasal mücadele önerilir. Birinci uygulamada kullanılan ürünün etki süresi bitiminden itibaren yapılan sayımlarda, zararlı yoğunluğu eşik üzerine çıkarsa, ikinci uygulama yapılır. Hasattan önce yapılan uygulamalarda, kullanılan akarisit bekletme süresi dikkate alınarak uygulamaya son verilir. Şayet zarar devam ediyorsa hasattan sonra da uygulama yapılabilir.

Karpuz - İki noktalı kırmızıörümcek

Rastgele seçilen bölgelerde bitkinin alt ve orta yapraklarında dekar başına 10 yaprakta sayım yapılır. Yaprak başına en az 5 canlı birey bulunduğunda uygulama yapılır.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ADI	KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
 ELMA	Avrupa kırmızıörümceği (<i>Panonychus ulmi</i>)	100 ml / 100 lt su (larva, nimf, ergin)	14 gün
 *PORTAKAL	Turunçgil kırmızıörümceği (<i>Panonychus citri</i>)	40ml / 100 lt su (yumurta, larva, nimf, ergin)	14 gün
 PAMUK	Pamuk kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>) İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	30 ml / da (yumurta, nimf, ergin)	42 gün
 **BAĞ	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	30 ml / 100 lt su (yumurta, larva, nimf, ergin)	14 gün
 KARPUZ	Pamuk kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>) İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	20 ml / da (larva, nimf, ergin)	3 gün

*Turunçgilde faydalılara karşı zararsız olduğu tespit edilmemiştir.

**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarıyla kullanılmaz.

Ürün Geliştirme Müdürü
Burak Uğur 0538 257 42 69

Ege Bölgesi Satış Temsilcisi
Cumhur Durgan 0538 057 34 06

İç Anadolu Bölgesi Satış Temsilcisi
Berat Palalı 0538 035 48 76

Ürün Geliştirme Müdürü
Erdal Eraydın 0532 131 10 13


Marmara Bölgesi Satış Temsilcisi
Ulaş Uysal 0538 035 51 04

Antalya Bölgesi Satış Temsilcisi
Mustafa Ali Tiğli 0538 683 54 11

Ürün Geliştirme Müdürü
Murat Ergül 0533 573 23 80

Karadeniz Bölgesi Satış Temsilcisi
Ahmet Rasim Serdaroğlu 0538 257 59 71

GAP Bölgesi Satış Temsilcisi
Ramazan Sezer 0538 035 44 40

 @uplturkey

 @upl.turkey



UPL Ziraat ve Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers No: 47B A Kule Kat: 31 D: 3107
35530 Bayraklı / İZMİR T: 0232. 446 57 89 - 90 F: 0232. 489 04 82 www.upl-ltd.com/tr

Kullanmadan önce etiketi ve ürün bilgisini okuyunuz.

Telif Hakkı © 2022 UPL. Tüm Hakları Saklıdır. ACRAMITE® 480 SC, UPL logo ve OpenAg™, United Phosphorus Limited şirketinin ticari markaları ve tescilli ticari markalarıdır.