

STRIM®

Etkili Madde: 960 g/l S-Metolachlor
Formülasyon Şekli: Emülsiyeye Olabilen Konsantre (EC)
Grubu: K3 HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)



Ambalaj:
1L

H E R B İ S İ T



**VERİM VE ZAMAN KAYBINI ÖNLEYEN
EKONOMİK VE GÜÇLÜ HERBİSİT**

Daha fazlası için

www.upl-ltd.com/tr



STRIM®

VERİM VE ZAMAN KAYBINI ÖNLEYEN
EKONOMİK VE GÜÇLÜ HERBİSİT



KULLANMA ŞEKLİ



Ekim öncesi toprağa pülverize edilir ve uygulamadan sonra toprağın 3-4 cm derinliğine karıştırılır. Toprakta etkili tüm herbisitlerde olduğu gibi STRIM®'den beklenen üstün sonuçların alınabilmesi için, iyi bir toprak işleme yapılmalı, toprak kesenek ot, vs. ihtiva etmemeli, toprakta yeterli nem bulunmalıdır. Ürünün toprağa iyi bir şekilde karıştırılması başarı için gereklidir. Ürün tapanın önüne atılmamalı, diskaro ile toprağa karıştırılmalıdır. Kültüvator kullanılacak ise çaprazvari iki defa çekilmesi önerilir. Uygulamadan sonra orta derecedeki bir yağış veya sulamanın, bitki koruma ürününün yabancı otların çoğunun çimlendiği toprağın üst tabakasına nüfus etmesine yardımcı olduğu bilinmelidir. Çok hafif (kum oranının %70'den fazla) topraklarda STRIM® kullanılması tavsiye edilmez. Kuru toprağa veya nem oranı çok düşük toprağa ekim yapılırken kullanmayınız. Kuru ekim şartlarında, ekimin hemen akabinde gelen şiddetli yağış veya sel baskını, düşük toprak sıcaklığı ile birlikte, kök bölgesinde normalin üzerinde ilaç birikimine ve bunun sonucunda ürün hasarına yol açabilir. STRIM® bu şartların ortaya çıkmasının muhtemel olduğu durumlarda kullanılmamalıdır. Suya doymuş topraklara uygulamayınız. Uygulamadan sonraki iki gün içinde şiddetli yağış veya fırtına bekleniyorsa uygulama yapmayınız. Uygulamadan sonraki en az iki günden önce sulama yapmayınız.

İkinci ürün: STRIM® uygulanmasından sonra altı ay içerisinde, mısır, şeker mısırı, tütün, pamuk, soya, ayçiçeği, yer fıstığı, brokoli, brüksel lahanası, lahana, karnabahar ve sorgum dışında bitki ekmeyiniz.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI	YABANCI OTLARIN ADI	KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
 PAMUK	Topalak (<i>Cyperus rotundus</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	140 ml/da (Ekim öncesi)	-
 DOMATES	Köpek Üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Horozibiği (<i>Amaranthus albus</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Topalak (<i>Cyperus rotundus</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	140 ml/da (Dikim öncesi)	70 gün



STRIM®, pamuk alanlarında bitkiyle rekabete giren ve bitkiyi baskılayarak verim ve zaman kaybı yaratan **TOPALAK, DARICAN** gibi yabancı otların kontrolünün sağlanmasında kullanılan güçlü bir herbisittir.

Dar ve geniş yapraklı yabancı ot sorununuzu çözmek için **FIST GOLD®** ile karışım yaparak kullanmanızı öneririz. Karışım sırasında tanka ilk önce **FIST GOLD®**, ardından STRIM® girmelidir.

Ürün Geliştirme Müdürü
Burak Uğurer 0538 257 42 69

Ege Bölgesi Satış Temsilcisi
Cumhur Durgan 0538 057 34 06

İç Anadolu Bölgesi Satış Temsilcisi
Berat Palalı 0538 035 48 76

Ürün Geliştirme Müdürü
Erdal Eraydın 0532 131 10 13


Marmara Bölgesi Satış Temsilcisi
Ulaş Uysal 0538 035 51 04

Antalya Bölgesi Satış Temsilcisi
Mustafa Ali Tiğlı 0538 683 54 11

Ürün Geliştirme Müdürü
Murat Ergül 0533 573 23 80

Karadeniz Bölgesi Satış Temsilcisi
Ahmet Rasim Serdaroğlu 0538 257 59 71

GAP Bölgesi Satış Temsilcisi
Ramazan Sezer 0538 035 44 40

 @upturkey

 @upl.turkey



UPL Ziraat ve Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers No: 47B A Kule Kat: 31 D: 3107
35530 Bayraklı / İZMİR T: 0232. 446 57 89 - 90 F: 0232. 489 04 82 www.upl-ltd.com/tr

Kullanmadan önce etiketi ve ürün bilgisini okuyunuz.

Telif Hakkı © 2022 UPL. Tüm Hakları Saklıdır. STRIM®, UPL logo ve OpenAg™, United Phosphorus Limited şirketinin ticari markaları ve tescilli ticari markalarıdır.